


Estado de Salud de los ancianos: Respuestas del Sistema de Salud


NIVELES DE CAPACIDAD

DESEMPEÑO

SOSTENIBILIDAD



Modificado de La Fond, Brown, Macintyre. Int J Health Plann Mgmt 2002;17:3-22




Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012

- Patrones de búsqueda de atención
 - Cuestionario de Hogar
 - Cuestionario de Adultos
- Características de la utilización de servicios ambulatorios
 - Cuestionario de Utilizadores


Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Discapacidad en la Población Mexicana, 2010

- Estimar y comparar el gasto de bolsillo en salud entre hogares con AM (60 años o más) con y sin alguna discapacidad

Patrones de búsqueda de atención




Afiliación por grupos de edad




Problemas de salud presentados las dos semanas previas a la encuesta

Porcentaje




Problemas de salud clasificados por tipo presentados las dos semanas previas a la encuesta

Porcentaje




Problemas de salud clasificados por tipo presentados las dos semanas previas a la encuesta en adultos mayores por afiliación



Tipo de servicio de salud utilizado para resolver el problema de salud que se presentó en las dos semanas previas a la encuesta


Porcentaje




Formal:
Encargado de la comunidad/promotor/aux, médico general, médico, especialista, dentista, enfermera, nutriólogo

Informal:
familiar, amigo(a)/vecino(a), dependiente de la farmacia, curandero, partera, yerbero, homeópata, naturista, acupunturista,

Porcentaje de adultos mayores que no utilizaron servicios de salud formales según su discapacidad




Porcentaje de adultos mayores que no utilizaron servicios de salud formales según su percepción de la gravedad de la enfermedad







Motivos de no atención en servicios formales de salud


Porcentaje



Motivos de no atención en servicios formales de salud en adultos mayores



Motivos de no atención en servicios formales de salud en adultos mayores según su discapacidad



Características de los adultos mayores con discapacidad*

	Sin discapacidad	Con discapacidad	
	n = 1452 73%	No permanente n = 220 12%	Permanente n = 293 15%
Edad	68.6	70.4	73.8
Mujer (%)	50.9	53.5	52.8
Indígena (%)	11.2	10.1	9.9
Jefe de hogar (%)	60.2	63.8	62.9
Escolaridad (años)	4.46	4.02	3.59
Trabajo pagado (%)	33.6	25.4	15.1
Seguro médico (%)	76.6	79.3	79.4
Días de inactividad por motivos de salud (último mes)	1.24	3.73	10.60
Rural (%)	51.7	55.7	51.2
TIPO DE DISCAPACIDAD (%)			
Caminar, moverse, subir o bajar		72.1	76.4
Ver, aún usando lentes		18.7	16.3
Hablar, comunicarse o conversar		0.43	0.85
Oír, aún usando aparato auditivo		4.35	5.49
Vestirse, bañarse o comer solo		2.3	0
Poner atención o aprender cosas sencillas		0.8	0
Alguna discapacidad mental		1.36	0.88

•En rojo diferencias estadísticamente significativas. *Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Discapacidad en la Población Mexicana, 2010*

Discapacidad permanente se refiere a una discapacidad cuya duración es mayor a seis meses

Gasto de bolsillo en salud asociados a la presencia de adultos mayores con discapacidad***

	Hogares con al menos un AM con discapacidad n = 301	Hogares con AM sin discapacidad n = 433
Consulta externa	1846	472
Cuidados médicos y de enfermería (ambulatorios)	169	0
Medicinas	631	336
Dispositivos (lentes, aparatos auditivos, prótesis)	70	53
Diagnósticos y exámenes de laboratorio	222	135
Servicios médicos y medicinas tradicionales	155	33
Transporte (búsqueda servicios de salud)	341	80
Hospitalización (anual)	917	1246
Seguros/primas (anual)	23	52
Gasto total trimestral en salud	3683	1422
Prevalencia de gasto catastrófico por motivos de salud	40%	25%

3.9 veces +

1.5 veces +


3 veces +

* Las cantidades están reportadas en pesos mexicanos y como gasto trimestral, excepto donde se indica

** En rojo diferencias estadísticamente significativas

Porcentaje de población que estuvo hospitalizado durante el último año por grupo de edad, ENSANUT 2012.

Porcentaje



Conclusiones. Primera parte

- La distribución de la afiliación por grupos de edad muestra que los grupos de 60 años y más se concentran en el IMSS y el ISSSTE mientras que los menores de 19 años se ubican como afiliados al seguro popular.
- Una proporción del 18% para el grupo de 60 y más y del 26% para el de 0 a 19 años se asumen como no afiliados a ninguna institución
- La principal causa de consulta de servicios ambulatorios curativos lo constituye el grupo de enfermedades transmisibles, maternas y de la nutrición; que representaron 57.5% de las causas.
- Sin embargo, en el grupo de adultos mayores, por afiliación (IMSS, Seguro Popular, ISSSTE y Ninguna), las Enfermedades No Transmisibles se reportan como principales razones de búsqueda de servicios con frecuencias de 37.9% hasta 44.1%.

Conclusiones. Primera parte

- De las personas en búsqueda de atención una proporción de entre el 10% al 17% busca atención en servicios informales siendo la cifra mas baja la correspondiente a los mayores de 60 años.
- Para el grupo de 60 años y mas las barreras económicas (hasta el 27%) son la principal razón de no búsqueda de atención formal y este porcentaje se incrementa para el caso de los ancianos con limitaciones en las actividades de la vida diaria.
- El 27% de los AM tienen algún tipo de discapacidad; de los cuales, casi 60% tiene discapacidad permanente.
- Los AM con discapacidad son de mayor edad y tienen menor probabilidad de contar con un trabajo pagado. La dificultad para caminar representan el principal tipo de discapacidad para los AM.


Conclusiones. Primera parte

- Los hogares con al menos un AM con discapacidad:
 - Gastan 3.9 veces más en consulta externa que aquellos hogares con AM sin discapacidad.
 - Gastan 1.8 veces más en medicinas que los hogares con AM sin discapacidad.
- 25% de los hogares con AM sin discapacidad incurren en gasto catastrófico por motivos de salud. Este número se eleva a 40% cuando el hogar tiene al menos un AM con discapacidad
- Del total de personas que reportaron haber estado hospitalizadas en el último año, la mayor proporción (6.2%) corresponde a los adultos mayores de 60 años de edad.

Utilización reciente de servicios ambulatorios


Porcentaje que utilizó servicios ambulatorios recientemente según su afiliación

Porcentaje



Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que se atendieron donde están afiliados


Porcentaje



Edad


Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que se atendieron en un consultorio de farmacia

Porcentaje




Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que se atendieron con un médico privado

Porcentaje




Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que calificaron como mala o muy mala la atención recibida

Porcentaje




Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que consideraron largo o muy largo el tiempo entre la cita y la consulta

Porcentaje



Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que pagaron 100 o más pesos en traslado al servicio

Porcentaje




Edad

Preg u401 vs u505

Utilizadores recientes de servicios ambulatorios que tuvieron que esperar *más* de 2 horas para su atención

Porcentaje



Centro de salud o equivalente =19.4

IMSS =16.2

ISSSTE =12.5

Médico privado =2.6

Consultorio de Farmacia =2.4



Edad

Preg u401 vs u510

Duración de la consulta en utilizadores recientes de servicios de salud

0-59 años



60 y más




Número de medicamentos recetados en utilizadores recientes de servicios de salud

0-59 años


60 y más



Comparativo del número de especialistas en Geriátría en la República Mexicana por 10,000 habitantes (>60 años para geriatría)



Índice de Médicos Internistas en contacto directo con el paciente, laborando en el sector salud por 10,000 hab. de 15 años y más



Fuente: Dirección de Información en Salud y Consejo Nacional de Poblacion. INEGI II. Censo de Población y Vivienda 2005.

Conclusiones. Segunda parte

- De entre aquellos que reportan haber utilizado servicios ambulatorios, el porcentaje más alto (entre 15 y 18%) se obtiene para los mayores de 60 años de edad.
- Sin embargo, los datos revelan que porcentajes que van del 30 al 50% no se atendieron en la institución que están afiliados. La cifra es mayor para los menores de 10 años y menor para los ancianos mayores de 60 años.
- De hecho los datos de uso de consultorios de farmacia y médico privado para todas las afiliaciones varía entre 10 y 22% para los menores de 10 años pero este dato disminuye especialmente para el caso de afiliados al IMSS y al ISSSTE donde para los mayores de 60 años la cifra se reduce al 2%.
- La percepción de calidad mala o muy mala tiene porcentajes más altos para el IMSS en un 9.6% seguida del ISSSTE pero para todas las instituciones ésta percepción disminuye para los adultos mayores a porcentajes menores al 2%.

Conclusiones. Segunda parte

- La proporción de pacientes que reportan haber esperado dos horas o mas para recibir atención superan el 20% tanto para el IMSS como para los Centros de Salud
- La duración de la consulta se encuentra alrededor de los 15 minutos, pero los adultos de 60 y mas reportan mayor tiempo, especialmente para el caso de médico privado
- A pesar de que la mayor frecuencia de medicamentos se ubica en 3, para el caso de los adultos mayores proporciones que llegan hasta el 20%, superan el número de 7 medicamentos
- Los especialistas en geriatría se han concentrado particularmente en los grandes centros urbanos: la ciudad y el estado de México, Jalisco y Nuevo León siendo la media nacional de 0.38 por 10,000 habitantes mayores de 60 años.